


DE LA PÁGINA OFICIAL DE SUTENT-FABRICANTE

¿Cómo FUNCIONA?

SUTENT puede demorar o detener algunos tipos de cáncer, como el GIST. Funciona mediante el bloqueo de dos procesos básicos que hacen que los tumores crezcan y se propaguen. Estos procesos se llaman **proliferación** y **la angiogénesis**.


Proliferación

Esto es cuando una célula se divide, la creación de dos células, donde antes había sólo una. Al igual que las otras células en su cuerpo, las células cancerosas se dividen. La diferencia es que las células cancerosas se dividen más veces de lo que deberían, formando un tumor. SUTENT puede ayudar a frenar este proceso.



Angiogénesis

Esto es cuando forman nuevos vasos sanguíneos. Estos nuevos vasos sanguíneos dan a los tumores los nutrientes y el oxígeno que necesitan para crecer. SUTENT puede ayudar a detener este proceso.




SUTENT puede ayudar a detener la proliferación y la angiogénesis mediante el bloqueo de las señales que las causan. Sin estos dos procesos, los tumores no pueden crecer.

COMO SE TOMA SUTENT

SUTENT viene con variaciones de 12,5 mg, 25 mg y 50 mg cápsulas que se toman una vez al día por vía oral. La mayoría de los pacientes toman SUTENT en un ciclo de dosificación: toman SUTENT todos los días durante 4 semanas (28 días), y luego se detiene durante 2 semanas (14 días). Los pacientes repiten este ciclo durante el tiempo que su médico se lo indique.

Ver un gráfico de la pauta de tratamiento a continuación.



Cosas importantes para recordar

- Tome SUTENT exactamente como su médico se lo indique
- Tome SUTENT 1 vez al día con o sin comida
- No abra las cápsulas SUTENT
- No beba jugo de toronja (pomelo) o coma toronjas durante su tratamiento con SUTENT. Ellos pueden hacer que usted tenga demasiado SUTENT en su organismo

SUTENT se toma generalmente de 4 semanas (28 días) y luego se detiene durante 2 semanas (14 días). Se trata de un ciclo de tratamiento.

Deberá repetir este ciclo de tomar SUTENT durante 4 semanas y luego suspenderlo durante 2 semanas, siempre y cuando su médico se lo indique

Su médico puede hacerle pruebas de sangre antes de cada ciclo de tratamiento

Si olvida una dosis, tómela tan pronto como se acuerde. No lo tome si está cerca de su próxima dosis. Simplemente tome la siguiente dosis a su horario habitual. No tome más de 1 dosis de SUTENT a la vez. Consulte a su médico acerca de cualquier dosis

Llame a su médico de inmediato si usted ha tomado demasiado SUTENT

Los posibles efectos secundarios graves

Algunos efectos secundarios son más graves que otros. Es importante que usted conozca los signos de estos efectos secundarios para que pueda informar a su médico si cualquiera de estos problemas.

SUTENT puede causar problemas graves del hígado, incluyendo la muerte.

Dígale a su médico de inmediato si usted tiene alguno de los siguientes durante el tratamiento con SUTENT:

- Picazón
- Ojos o piel amarilla
- Orina oscura
- Dolor o molestia en la parte superior del abdomen derecho.

Su médico debe hacerle pruebas de sangre para comprobar su función hepática antes de comenzar a tomar SUTENT y durante el tratamiento.

SUTENT puede causar problemas del corazón, incluyendo:

- La insuficiencia cardíaca
- Los problemas del músculo cardíaco (miocardiopatía)
- Dígale a su médico si se siente mareado, débil, muy cansado, tiene un ritmo cardíaco anormal, tienen falta de aliento, o tiene los pies y los tobillos hinchados
- Cambios anormales en el ritmo cardíaco.
- Su médico puede hacer electrocardiogramas y exámenes de sangre para observar estos problemas durante el tratamiento con SUTENT. Dígale a su médico si se siente mareado, débil, o latidos anormales del corazón mientras esté tomando SUTENT

- SUTENT puede causar presión arterial alta. Su médico puede revisar su presión arterial durante el tratamiento con SUTENT. Él o ella puede recetarle medicinas para tratar la presión arterial alta, si es necesario.

SUTENT puede causar una hemorragia que a veces lleva a la muerte. Dígale a su médico de inmediato si usted tiene cualquiera de los siguientes síntomas durante el tratamiento con SUTENT:

- Seria hemorragia
- Estómago dolorosa hinchazón (abdomen)
- Vómitos de sangre
- Negro heces pegajosas
- Sangre en la orina
- Dolor de cabeza o cambios en su estado mental

Su médico le puede hablar de otros síntomas que debe vigilar.

SUTENT puede causar problemas hormonales, como la tiroides y la glándula suprarrenal. Su médico puede realizar pruebas para comprobar su tiroides y la función de la glándula suprarrenal durante el tratamiento con SUTENT. Dígale a su médico si usted tiene cualquiera de los siguientes signos y síntomas durante el tratamiento con SUTENT:

- Cansancio que se agrava y no se quita
- Pérdida del apetito
- Intolerancia al calor
- Sentirse nervioso o inquieto, temblores
- Transpiración
- Náuseas o vómitos
- Diarrea
- Frecuencia cardíaca rápida
- El aumento de peso o pérdida de peso
- Sentirse deprimido
- Períodos menstruales irregulares o ausencia de períodos menstruales
- Dolor de cabeza
- Caída del cabello

Los efectos secundarios comunes

Los pacientes que toman SUTENT tienen estos efectos secundarios con más frecuencia que otros efectos secundarios:

- La medicina en SUTENT es amarilla, y puede hacer que su piel luzca de color amarillo. Su piel y el cabello puede obtener un color más claro
- Cansancio
- Debilidad
- Fiebre
- Los síntomas gastrointestinales, como diarrea, náuseas, vómitos, llagas en la boca, malestar estomacal, dolor abdominal y estreñimiento. Hable con su médico acerca de maneras de manejar estos problemas.
- Erupción cutánea u otros cambios en la piel, incluso más seca, más gruesa, o formación de grietas.
- Ampollas o un sarpullido en las palmas de las manos y plantas de los pies.
- Cambios en el gusto.
- Pérdida del apetito.
- Dolor o hinchazón en los brazos o las piernas
- Tos
- Dificultad para respirar
- Sangrado, tales como hemorragias nasales o sangrado de los cortes

Llame a su médico si usted tiene alguna inflamación o sangrado durante el tratamiento con SUTENT.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de SUTENT. Para más información, consulte a su médico o farmacéutico. Llame a su médico para asesoramiento médico sobre los efectos secundarios.

Usted puede haber tenido algunos de los efectos secundarios mencionados anteriormente antes de iniciar el tratamiento con SUTENT. **Asegúrese de decirle a su médico si hay algún cambio o aumento de sus efectos secundarios.**

GESTION DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS

La gestión de la fatiga.

Si se siente cansado o débil, estos consejos pueden ayudarle:

- Tome siestas cortas
- Coma bien y beba líquidos en abundancia
- Haga caminatas cortas o haga ejercicio ligero

Gestión de los cambios diarrea o evacuaciones intestinales.

Estos síntomas pueden ser tratados con medicamentos de venta libre. Pregúntele a su médico o enfermera qué producto puede ser mejor para usted.

Si usted tiene diarrea, estos consejos también pueden ayudar:

- Evite las comidas picantes, alimentos grasos, cafeína, y la fruta
- Coma sólo alimentos suaves
- Beba agua con frecuencia, pero sólo en pequeños sorbos

Náuseas o vómitos gestión. Si usted tiene estos problemas, hable con su médico o enfermera. Él o ella pueden recetarle un medicamento para estos síntomas.

Si tiene náuseas o vómitos, estos consejos también pueden ayudar:

- Coma comidas pequeñas
- Evite los alimentos que son dulces, fritos o grasos
- Beba muchos líquidos, pero en pequeñas cantidades

La gestión de llagas en la boca / estomatitis

Si tiene estomatitis, estos consejos pueden ayudarle:

- Evite los alimentos calientes, picantes o ácidos
- Coma alimentos que sean suaves
- Utilice una pajita para beber líquidos
- Use un enjuague bucal sin alcohol y enjuáguese la boca con frecuencia con agua
- Evite las pastas dentales con blanqueadores (es decir, agua oxigenada)

La gestión de malestar estomacal.

Si usted tiene un malestar estomacal, estos consejos pueden ayudarle:

- Evite las comidas pesadas, el café y el alcohol
- Reduzca el estrés
- Duerma en una posición más vertical, apoyado sobre una almohada
- Tome un antiácido

La gestión de problemas de la piel.

Dígale a su médico o enfermera si tiene problemas en la piel. Él o ella le pueden dar un tratamiento específico.

Estos podrían incluir:

- Lociones o cremas hidratantes específicas
- Medicamentos para el dolor como el ibuprofeno.

Gestión de cambios en el gusto.

Si usted tiene cambios en el gusto, estos consejos pueden ayudarle:

- Los alimentos fríos o congelados pueden tener mejor sabor que los alimentos calientes
- De sabor a sus alimentos con hierbas, especias, azúcar, limón o salsas
- Mantenga una boca limpia y sana mediante el cepillado y uso de hilo dental con frecuencia

Otros efectos secundarios.

Los pacientes también han tenido otros efectos secundarios menos comunes cuando se toman SUTENT. Para obtener una lista más completa de todos estos efectos secundarios, consulte con su especialista en cáncer, enfermera o médico.